

AVISOS AGRÍCOLAS

ESTAÇÃO DE AVISOS DO DÃO

MACIEIRA

PEDRADO

Caso tenha o seu pomar desprotegido e não tenha realizado o tratamento preventivo aconselhado na mensagem SMS enviada no dia 19 de maio, deve realizar tratamento de imediato, utilizando um produto de ação curativa. Nos pomares ainda protegidos e atendendo que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê a continuação de tempo instável, com precipitação e trovoadas, recomendamos a renovação de tratamento assim que terminar a persistência do anterior.

Atendendo que, a precipitação associada a trovoadas é por vezes intensa, alertamos que os produtos com ação de contacto são lavados quando ocorre uma quantidade de precipitação superior a 20 a 25 l/m². Mantenha a vigilância, adotando a estratégia de proteção que, de momento, melhor se aplica no seu pomar.

BICHADO-DA-FRUTA

O voo da praga continua intenso. Mantenha o seu pomar protegido, posicionando o tratamento após ultrapassado o período de instabilidade previsto para os próximos dias.

OLIVAL

OLHO-DE-PAVÃO

As condições climatéricas mantêm-se propícias à instalação e desenvolvimento da doença. Nos olivais onde já terminou a floração, realize um tratamento. Caso a floração ainda esteja a decorrer, aguarde que esta se conclua antes de proceder ao tratamento.

VINHA

MÍLDIO

Aconselhamos a realização imediata de um tratamento anti-míldio, em particular, nas vinhas que se encontram desprotegidas e onde não tenha sido realizado o tratamento preventivo aconselhado na mensagem SMS enviada no dia 19 de maio. Opte por um produto sistémico de ação curativa.

Considerando que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê continuação de tempo instável durante os próximos dias e que nos encontramos numa fase de grande sensibilidade à doença, aconselhamos, nas vinhas onde foi adotada a estratégia de tratamento preconizada na Circular de Aviso nº 6, a renovação do mesmo assim que terminar a persistência de ação do anterior.

OÍDIO

A proteção contra esta doença deve manter-se até ao estado fenológico – Pintor. Nas vinhas desprotegidas, em particular, nas castas ou zonas mais favoráveis a esta doença, aconselhamos a aplicação de um fungicida anti-oídio sistémico.

PODRIDÃO NEGRA

Considerando que já foram observados sintomas de Podridão negra (Black-rot) e que as condições se encontram favoráveis ao seu desenvolvimento, aconselhamos que na seleção de fungicidas opte por soluções com eficácia sobre esta doença.

A equipa técnica da EADão