

AVISOS AGRÍCOLAS

ESTAÇÃO DE AVISOS DO DÃO

MACIEIRA

BICHADO-DA-FRUTA

Continuamos a registar capturas significativas de adultos de Bichado-da-fruta nas armadilhas instaladas nos Postos de Observação Biológica (POB's). Aconselhamos o acompanhamento da evolução da praga apenas nas variedades de maturação mais tardia. Observe 1000 frutos (20 frutos x 50 árvores) e trate caso detete 5 a 10 frutos bichados (NEA).

MOSCA DO MEDITERRÂNEO

Já registámos capturas de adultos de Mosca-da-fruta nas armadilhas instaladas nos Postos de Observação Biológica (POB's). Deve manter a vigilância nas variedades de colheita mais tardia e caso detete a presença da praga, deve efetuar um tratamento de imediato.

Nota: Reforçamos que as recomendações se destinam apenas às variedades mais tardias. Se verificar a presença das pragas de acordo com o Nível Económico de Ataque (NEA) opte, preferencialmente, por um produto que tenha eficácia sobre as pragas visadas. Deve ter em atenção o Intervalo de Segurança que corresponde ao número de dias que decorre entre a aplicação e a colheita.

OLIVAL

MOSCA DA AZEITONA

As elevadas temperaturas registadas até ao momento contribuíram para a limitação da praga e os ataques nas azeitonas têm sido, por esta razão, controlados naturalmente. Contudo as temperaturas amenas previstas para os próximos dias, o significativo número de adultos capturados nas armadilhas e o facto de já termos observado frutos com orifícios de saída, prevê um aumento de frutos picados. Deste modo, recomendamos que proceda à Estimativa do Risco observando 100 azeitonas ao acaso e a realização de tratamento se registar 8 a 12 azeitonas picadas com ovos ou larvas vivas.

Gafa e OLHO-DE-PAVÃO

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê a ocorrência de precipitação para o fim-de-semana. A verificar-se esta condição recomendamos, logo após a ocorrência de precipitação, a realização de um tratamento. Ambas as doenças são prejudiciais aos frutos e folhas, a Gafa causa o apodrecimento dos frutos, originando azeites muito ácidos e de fraca qualidade, e o Olho-de-Pavão severas desfoliações da copa das oliveiras.

Nota: Caso o seu olival se encontre plantado em consociação com vinha e atendendo à antecipação do período de vindimas, aconselhamos a realização dos tratamentos só após a sua conclusão.

BATATEIRA

EPITRIX sp.

Nos tubérculos são observadas galerias com um traçado sinuoso causado pelas larvas. Recomenda-se a adoção das seguintes medidas preventivas: a limpeza dos campos, a destruição de restos de cultura, a eliminação de zorras e infestantes e a rotação com culturas não solanáceas.

TECIA SOLANIVORA

A *Tecia solanivora*, também designada por Traça da Guatemala, é uma praga de quarentena que ataca os tubérculos da batata. A lagarta é semelhante à comum Traça-da-batata, mas provoca orifícios e galerias de maior dimensão, a penetrarem mais profundamente na polpa da batata. Se observar sintomas suspeitos deste organismo contacte, de imediato, os serviços da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro.

A Equipa Técnica da EADão