

AVISOS AGRÍCOLAS

ESTAÇÃO DE AVISOS DO DÃO

MACIEIRA

Bichado-da-fruta

Devido à intensificação do voo nos nossos Postos de Observação Biológica e uma vez que as condições se encontram favoráveis ao desenvolvimento desta praga, recomendamos a renovação do tratamento assim que terminar a persistência do anterior.

Cochonilha de S. José

Atingiu-se o somatório de temperaturas para a ocorrência da 2.ª geração de cochonilha de S. José, pelo que se aconselha a realização de tratamento apenas nos pomares/parcelas onde se verifique a presença desta praga. A sua incidência é localizada, não se justificando, na maioria dos casos, um tratamento generalizado a todo o pomar.

Mosca-da-Fruta

Já foram intercetados adultos de Mosca-da-Fruta em todos os Postos de Observação Biológica. Aconselhamos vigilância do seu pomar, em particular, durante o processo de maturação das variedades. Acompanhe a evolução da Mosca-da-Fruta no seu pomar colocando as armadilhas para monitorização da praga. Ao início das capturas, deve efetuar uma amostragem de frutos com vista à identificação das primeiras picadas (5 frutos x 30 árvores) e avaliar o nível económico de ataque (1 a 3% de frutos atacados) a fim de tomar a decisão de tratamento na sua parcela.

Caso opte pelo método de captura em massa ou atração e morte pode recorrer à solução artesanal com garrafas de 1,5 litros, com 8 furos de 0,5 mm de diâmetro no terço superior da garrafa, contendo fosfato diamónio diluído em água ou soluções já existentes no mercado, tais como: armadilhas à base das substâncias ativas esfenvarelato, proteínas hidrolisadas ou deltametrina. Na luta química encontram-se homologadas as seguintes substâncias ativas: deltametrina (IS: 7 dias), lambda cialotrina (IS: 7 dias); acetamiprida (IS: 14 dias).

Nota: Opte por produtos que combatam simultaneamente diversas finalidades e respeite sempre o Intervalo de Segurança que consta no rótulo das embalagens.

BATATEIRA

Traça-da-batata

Para prevenir o ataque de Traça-da-batata e reduzir possíveis prejuízos, recomendamos as seguintes medidas culturais:

- Para evitar o aparecimento de fendas no solo e impedir as posturas nos tubérculos, mantenha a terra húmida através de regas regulares e as batatas cobertas de terra com amontoas;
- Corte a rama da batateira antes de proceder ao arranque da batata e não a utilize para cobrir a batata no terreno ou mesmo os sacos;
- Armazene de imediato a batata, eliminando as que apresentarem sintomas evidentes de Traça;
- A rama deve ser retirada imediatamente do terreno e proceda à sua destruição, pois assim eliminará uma grande quantidade de ovos e lagartas que aí se possam encontrar;
- Se detetar adultos (borboletas) no local de armazenamento, procure fazer uma nova triagem das batatas, retirando as que tiverem sintomas de traça;
- Vede bem as janelas e portas, para impedir a entrada de borboletas da traça, mas garanta que o ar circule livremente.

Para mais informações consulte o folheto informativo da DRAPCentro disponível [aqui](#).

INFORMAÇÃO FITOSSANITÁRIA

Trioza erytreae

No passado dia 12 de julho foi publicado o [Despacho n.º 53/G/2022](#), que atualiza a Zona Demarcada para *Trioza erytreae*, na sequência de novos resultados positivos de prospeção a esta praga de quarentena. Consulte também o [Edital](#) onde constam as medidas e freguesias incluídas na área de abrangência da DRAPCentro.

A equipa técnica EADão