

AVISOS AGRÍCOLAS

ESTAÇÃO DE AVISOS DO DÃO

MACIEIRA - Pedrado

Face à previsão de chuva para a próxima semana, principalmente nos pomares onde existam manchas de pedrado, deve continuar a manter o pomar protegido de forma a evitar novas infeções. Utilize um produto de ação preventiva

MACIEIRA - Bichado-da-fruta

Nalguns postos de observação biológicos o voo continua intenso. Deve renovar a proteção do seu pomar contra o bichado.

BATATEIRA - Míldio da Batateira

Os sintomas da doença continuam visíveis em alguns batatais da região. As previsões de chuva para a próxima semana e as manhãs húmidas são propícias à ocorrência de novas infeções. Mantenha a cultura protegida.

BATATEIRA - *Epitrix sp.*

O *Epitrix* é um pequeno inseto de cor negra da família dos coleópteros, semelhante às álticas ou “pulguinhas”. As suas larvas causam estragos nos tubérculos (linhas na casca) desvalorizando a batata. Nesta altura, os adultos ao alimentarem-se provocam pequenos orifícios redondos nas folhas, conferindo-lhes um aspeto crivado. Aconselhamos vigilância e na presença da praga realize tratamento com a substância ativa acetamiprida. Desta forma evitará as posturas e desenvolvimento de larvas causadoras de estragos nos tubérculos e reduzirá os níveis populacionais nas gerações seguintes.

Psila Africana dos citrinos- Trioza erytrae

O Despacho nº 5573/2020, do dia 18 de maio de 2020, procedeu a nova atualização das zonas demarcadas para *Trioza*, sem alterações das freguesias da DRAPCentro. Este despacho mantém a **obrigatoriedade** de realização das medidas fitossanitárias, nomeadamente corte e destruição de partes vegetais infestadas e tratamento desses citrinos para esta praga por todos os **proprietários** ou **detentores** de plantas **de citrinos** localizadas nas freguesias da Zona Demarcada. Consulte a lista atualizada de freguesias incluídas em Zona Demarcada em <https://bit.ly/2ZBbWPc>

Caso detete sintomas suspeitos deste organismo contacte a Direção Regional de Agricultura.

VINHA - Míldio

A precipitação prevista poderá provocar novas infeções de míldio. Nalguns locais onde a queda pluviométrica foi elevada já foram observadas manchas de míldio. Nesses locais as orvalhadas noturnas poderão ter favorecido novas infeções secundárias. Renove o tratamento para míldio antes das chuvas. Nas vinhas onde haja manchas de míldio deve efetuar um tratamento com um produto de ação curativa e anti-esporulante.

VINHA – Oídio

A vinha encontra-se na fase de floração/alimpa, de extrema sensibilidade a oídio. Deve continuar a manter a sua vinha protegida para oídio.

VINHA – Podridão negra (Black rot)

Tem-se verificado uma forte presença de manchas desta doença nalgumas vinhas, cuja propagação tem sido limitada pelas temperaturas acima dos 24°C. As duas semanas após a floração/alimpa são as de maior perigosidade desta doença para a vinha. Atendendo à forte presença de inóculo nalgumas vinhas, à previsão de precipitação e de descida da temperatura, na escolha do produto anti-míldio ou anti-oídio, opte por um com ação para podridão negra.

Xylella fastidiosa

Ofício Circular n.º 15 de 13 de Maio de 2020 Divulga o alargamento da zona demarcada para *Xylella fastidiosa*, em consequência de novos resultados positivos e determina as medidas que devem ser aplicadas para a sua erradicação.

Qualquer suspeita da presença da doença deve ser de imediato comunicada aos respetivos serviços de inspeção fitossanitária desta Direção Regional ou do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

Para mais informação consulte o seguinte link: <https://www.drapc.gov.pt/base/noticias.php?noticia=15108>

A equipa técnica da EADão