

AVISOS AGRÍCOLAS

ESTAÇÃO DE AVISOS DO DÃO

VINHA - Míldio

O IPMA prevê precipitação para o final desta semana. A vinha encontra-se no final da floração início de bago de chumbo e temos observado algumas manchas de míldio por vezes no cacho. Renove o tratamento para míldio, procurando que a calda molhe bem os cachos.

VINHA – Oídio

A humidade noturna favorece o desenvolvimento desta doença. Continue a manter a vinha protegida para oídio.

VINHA – Podridão negra (Black rot)

A fase de maior sensibilidade da videira a podridão negra corresponde às duas semanas após a floração. Nas vinhas onde haja manchas ou um histórico desta doença, deve continuar a manter a proteção para podridão negra.

Xylella fastidiosa

Chamamos a vossa atenção para o Despacho 6018/2020 de 3 de junho que define a zona demarcada e medidas fitossanitárias para a *Xylella fastidiosa*.

Xylella fastidiosa é uma bactéria de quarentena (cuja presença não é permitida no território da União Europeia) de grande perigosidade para diversas culturas, nomeadamente vinha e olival. A sua recente deteção na Europa obrigou à publicação de legislação comunitária estabelecendo medidas de emergência para o seu controlo.

Qualquer suspeita da presença da doença deve ser comunicada aos respetivos serviços de inspeção fitossanitária desta Direção Regional ou do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Para mais informação consulte o seguinte link: <https://www.drapc.gov.pt/base/noticias.php?noticia=15108>

MACIEIRA - Pedrado

Face à previsão de chuva, para o final da semana, principalmente nos pomares onde existam manchas de pedrado, deve renovar a proteção para pedrado de forma a evitar novas infeções. Utilize um produto de ação preventiva

BATATEIRA - Míldio da Batateira

Continuamos a verificar a presença desta doença nos batatais. Face às previsões de chuva para a próxima semana deve continuar a manter a cultura protegida.

CITRINOS-Psila-africana-dos citrinos

Conforme informámos na nossa última circular a presença deste inseto em citrinos implica o corte e destruição no local da folhagem infestada e o tratamento da planta com um dos seguintes produtos homologados: EPIK SG, EPIK SL OUPOLYSECT ULTRA PRONTO (uso não profissional).

NOTA: Não Trate se os seus citrinos estiverem em floração. Realize o tratamento apenas após o vingamento dos frutos, altura em que já não são visitados pelas abelhas.

A equipa técnica da EADão